


胆汁酸诊断流程



有关鉴别/排除胆汁酸升高的可能原因的步骤, 请参阅资料反面



胆汁酸和/或肝酶升高?

评估肝外疾病



可能原因

- 胰腺炎
- 胃肠道疾病
- 内分泌疾病
 - 肾上腺皮质功能亢进
 - 甲亢
 - 糖尿病
- 肝外肿瘤
- 灌注不足 (充血性心力衰竭, 休克)
- 创伤
- 药物诱导 (ALKP/GGT)
 - 类固醇, 苯巴比妥
- 肌肉疾病 (ALT/AST)
- 溶骨性疾病/骨溶解 (ALKP)



考虑执行

- SNAP cPL[®]检测/SNAP fPL[®]检测
- 影像学检查
- 内分泌检查

调查潜在的肝胆疾病



可能原因

- 炎症 (慢性肝炎和胆管肝炎)
- 感染 (钩端螺旋体病和细菌性胆管肝炎)
- 毒副作用 (NSAID、苯巴比妥和西米棕桐)
- 血管异常 (门脉分流, 微血管发育不良)
- 肿瘤 (原发或转移)
- 胆汁淤积性肝病
 - 脂质沉积
 - 液泡性肝病
- 肝硬化
- 胆道疾病
 - 粘液囊肿
 - 胆结石
 - 胆道肿瘤
 - 胆囊炎
- 与品种有关的升高 (马耳济斯犬)



考虑执行

- 凝血指标 (PT/aPTT)
- 血氨
- 影像学检查
- 细胞学检查
- 活检
 - 根据指示进行特殊检查 (肝脏铜浓度和肝组织培养)
- 传染病检测