


Catalyst 皮质醇检测

结果判读说明

Catalyst™ 皮质醇检测提供的结果判读可帮助您为患宠制定最佳后续诊疗方案。为充分利用这一重要信息,请先思考以下问题,然后按步骤操作:

- 是否需要为同一患宠进行多次皮质醇检测?**如答案为“是”,且您已进行过初始皮质醇检测,请遵循**“追加检测……”**部分的说明操作,以确保每次的定量结果可按顺序分组,并获取**全面的结果判读**。
- 是否已输入检测方案信息?**为获得针对结果的判读,您必须为患宠的检测选择正确的检测方案及方案步骤——请务必遵循以下针对您所用分析仪的特定工作流程进行操作:



初始皮质醇检测

Catalyst One™ 生化分析仪



在 IDEXX VetLab™ Station 上启动检测。在“选择仪器”界面,点击**“Catalyst One”**,然后点击**“皮质醇”**。选择所需的检测方案及其追加检测方案步骤,点击**“保存”**,然后点击**“运行”**。

追加检测/多步骤皮质醇检测

在初始检测时选择的所有方案步骤均会显示在 IDEXX VetLab Station 首页的“进行中”列表内。当需要处理下一个样本时,请点击列表中下一个待测项,点击**“已排队”**,然后点击**“开始运行”**。

Catalyst Dx™ 生化分析仪



按照您在 IDEXX VetLab Station 上的常规操作启动检测。运行结束后,根据提示确认检测方案及方案步骤,然后点击**“提交”**。

注意:如果您选择稍后输入检测方案/方案步骤,请点击“进行中”列表中的患宠,点击**“添加详情”**,然后选择患宠的检测方案信息。

为确保追加检测结果和初始检测结果归为一组,并获取结果判读:

1. 在 IDEXX VetLab Station 上找到患宠的初始皮质醇检测结果,或从首页“待测样本”列表中选择相应患宠。
2. 点击**“添加检测”**,然后点选**“追加结果”**。
3. 在“选择仪器”界面,选择**“Catalyst Dx”**。
4. 运行结束时,根据提示选择本次运行的检测方案信息,然后点击**“提交”**。

重要提示:如果您同时配备 Catalyst One 和 Catalyst Dx 分析仪,且需对患宠的皮质醇检测结果进行趋势分析,和/或开展追加检测/多步骤皮质醇检测,IDEXX 建议所有皮质醇检测均使用同一台分析仪,并采用相同类型的样本进行操作。

要查看定量结果和结果判读:

点击 IDEXX VetLab Station 左下角的消息,显示患宠的检测结果已就绪。当追加检测添加为多步骤皮质醇检测的组成部分时,结果列表将按时间倒序显示(最新追加检测结果位于列表顶部,初始检测结果置于底部),全面的结果判读随最新结果显示。